

Zorgprotocol farmaceutische patiëntenzorg
Maagbescherming bij NSAID gebruik

ZP-1



Risico Analyse:

Item	Aanwezig	Punten/item
Verstrekking van (niet selectief) NSAID	<input type="checkbox"/>	2,0
Hoog gedoseerd gebruik van NSAID (zie tabel 2)	<input type="checkbox"/>	0,5
Ulcuslijden (peptische ulcus of -complicatie in de voorgeschiedenis)	<input type="checkbox"/>	1,0
Leeftijd 70+	<input type="checkbox"/>	1,0
Leeftijd tussen de 60 en 70 jaar	<input type="checkbox"/>	0,5
Gebruik van antithrombotica:		
– (lage dosering) acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium	<input type="checkbox"/>	0,5
– cumarinederivaat	<input type="checkbox"/>	0,5
– DOAC/NOAC (dabigatran, rivaroxaban of apixaban)	<input type="checkbox"/>	0,5
– clopidogrel*, prasugrel, ticagrelor	<input type="checkbox"/>	0,5
Gebruik van:		
– Gebruik van coxib, bijv. celecoxib of etoricoxib	<input type="checkbox"/>	0,5
– Systemisch werkende (gluco)corticosteroïden (zie tabel 1)	<input type="checkbox"/>	0,5
– SSRI, venlafaxine, duloxetine of trazodon	<input type="checkbox"/>	0,5
– Spironolacton	<input type="checkbox"/>	0,5
Comorbiditeit (ernstig invaliderend) reumatoïde artritis, hartfalen of diabetes mellitus)	<input type="checkbox"/>	0,5
Totaal score	=	

Maagprotectie is gewenst bij een totaalscore van 3 of hoger
 (bij een score van 2,5 is maagbescherming te overwegen)

Conclusie (aanvinken):

- Geen maagbescherming nodig.
- Maagbescherming nodig volgens protocol
PPI (omeprazol* 20mg of pantoprazol 40mg) toegevoegd door apotheek of reeds aanwezig.
- Maagbescherming nodig volgens protocol
Patiënt wenst geen maagbescherming (melding aan arts).

* bij het gebruik van clopidogrel wordt omeprazol ontraden, geef in dit geval een ander ppi zoals pantoprazol 40mg

Versie: oktober 2018

Bronvermelding: HARM Onderzoek/ CBO richtlijn NSAID gebruik en Preventie van Maagschade (anoniem 2003a), NHG standaard maagklachten en Landelijke Set MFB's, 16 Maagbescherming bij NSAID gebruik.

Tabel 1, Systemisch werkend corticosteroid in actuele medicatie?

Betamethason
Budesonide
Cortison
Dexamethason
Hydrocortison
Methylprednisolon
Prednison
Prednisolon
Triamcinolon

Tabel 2, Hoge dosering NSAID?

NSAID	Totaal aantal mg per dag:	
	Oraal (mg)	Rectaal (mg)
Aceclofenac	200	
Dexibuprofen	800	
Dexketoprofen	75	
Diclofenac	100	100
Diflunisal	750	
Fenylbutazon	300	
Ibuprofen	1200	1200
Indometacine	100	100
Ketoprofen	150	
Meloxicam	15	
Nabumeton	1000	
Naproxen	500	500
Piroxicam	20	
Tiaprofeenzuur	600	
Acetylsalicylzuur	3000	
Carbasalaatcalcium	3600	
Propyfenazon	3000	3000