

# Medicijnen bij glaucoom of hoogteziekte



acetazolamide

## UW MEDICIJN IN HET KORT:

- Wordt onder andere gebruikt bij verhoogde oogdruk (glaucoom) of bij hoogteziekte.
- Meestal voor een korte tijd gebruiken.
- De werking begint binnen 2 tot 4 uur.
- Bijwerkingen, zoals oorsuizen, problemen met horen, zwarte ontlasting of bloed bij de ontlasting, kunnen optreden.
- Dit medicijn kan van invloed zijn op uw rijvaardigheid. Wilt u meer informatie? Kijk op [rijveiligmetmedicijnen.nl](http://rijveiligmetmedicijnen.nl) of vraag uw apotheek om advies.
- Let op! Kan een ongunstige wisselwerking hebben met pijnstillers die zonder recept te krijgen zijn. Informeer voor gebruik eerst bij uw apotheek.



## WERKING

### Hoe helpt dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een verhoogde oogdruk (glaucoom). Het wordt onder andere gebruikt bij een oogoperatie, zoals staaroperatie. Verder kan het gebruikt worden bij hoogteziekte of om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld bij bergbeklimmen. Soms wordt het gebruikt bij epilepsie of een verhoogde druk in de schedel bij kinderen.

Door gebruik van dit medicijn maakt het oog minder oogvocht aan. Hierdoor neemt de druk in het oog af. Verder zorgt het er ook voor dat het lichaam meer vocht kwijtraakt en verlaagt het de druk in de schedel. Daarnaast vermindert het aanvallen van epilepsie.



## GEBRUIK

### Hoelang moet u dit medicijn gebruiken?

Bij een verhoogde oogdruk en bij (het voorkomen van) hoogteziekte wordt het medicijn meestal voor een korte tijd gebruikt. Gebruik het medicijn zo lang de dokter u verteld heeft.

### Wanneer merkt u dat dit medicijn helpt?

De werking begint binnen 2 tot 4 uur. Het verlagen van de oogdruk kan 8 tot 12 uur aanhouden.

### Hoe neemt u dit medicijn in?

Tablet innemen met een half glas water.

Drank: de fles goed schudden voor gebruik. De voorgeschreven hoeveelheid afmeten met de bijgeleverde maatbeker of spuit.

Dit medicijn kan ook toegediend worden door een dokter via een injectie.

### Let op!

Sommige medicijnen kunnen een ongunstige wisselwerking hebben met dit medicijn. Ook voor medicijnen die u zonder recept kunt kopen (bijv. bij de drogist) kan dit het geval zijn. Informeer daarom eerst bij uw apotheek als u een (ontstekingsremmende) pijnstiller wilt gaan gebruiken. Paracetamol mag u wel gebruiken.

## Medicijn vergeten?

- Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: is het nog dezelfde dag? Neem de dosering dan alsnog in. Is het al de volgende dag? Sla dan de vergeten dosering over.
- Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het langer dan 4 uur voor u de volgende moet innemen? Neem de vergeten dosering alsnog in. Duurt het minder dan 4 uur voor de volgende? Sla dan de vergeten dosering over.
- Als u dit medicijn 3 of meer keer per dag gebruikt: vraag advies aan uw dokter of apotheker.

## Hoe moet u dit medicijn bewaren?

Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.



## BIJWERKINGEN

### Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)?

Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)?

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Als u dit middel gebruikt kunt u last krijgen van oorsuizen, problemen met horen, zwarte ontlasting of bloed bij de ontlasting, problemen met lever of nieren, en huiduitslag. Ook kunt u zich duizelig voelen, slaperig of suf zijn. Neem contact op met uw apotheker of dokter als u zich ongerust maakt of een bijwerking erg vervelend is. Waarschuw in ieder geval uw dokter bij: keelpijn, koorts, blaasjes in de mond, heel erg moe zijn, bleek zien, onverwachte en moeilijk te stoppen bloedingen of plotselinge blauwe plekken. Verder bij erge uitslag met koorts, blaren op de huid, blaren in de mond, in de vagina of op de top van de penis.

Dit medicijn kan van invloed zijn op uw rijvaardigheid. Meer informatie: [www.rijveiligmetmedicijnen.nl](http://www.rijveiligmetmedicijnen.nl) of vraag uw apotheek om advies. Wettelijk bent u aansprakelijk als u onder invloed bent van medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. U kunt dit vergelijken met alcoholgebruik in het verkeer.

**Lees voor meer informatie ook de bijsluiter.**

Dit medicijn kan invloed hebben op uw rijvaardigheid. Volgens de wet bent u aansprakelijk als u gaat rijden wanneer uw rijvaardigheid is verminderd door een medicijn. Dat geldt voor auto, motor of scooter rijden. En ook op de fiets. U kunt dit vergelijken met alcoholgebruik in het verkeer. Ook uw ziekte kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Overleg met uw dokter of u mag rijden.

#### **Het advies voor dit medicijn:**

Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze kunnen uw rijvaardigheid verminderen. Deze bijwerkingen zijn bijvoorbeeld duizeligheid, slaperigheid en suf zijn.

Dit geneesmiddel heeft een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit kunt u vergelijken met 0,5-0,8 promille alcohol in uw bloed. Bij meer dan 0.5 promille (ongeveer 2 glazen) mag u volgens de wet niet meer rijden.

U mag daarom de eerste week dat u dit medicijn gebruikt niet rijden. Na een week zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. Beoordeel na een week hoeveel last u van de bijwerkingen heeft. Rijd geen auto als u last van bijwerkingen heeft.

Gebruikt u ook andere medicijnen met invloed op het reactievermogen? Het rij-advies kan anders zijn. Vraag advies aan uw arts of apotheker.

#### **Tips voor als u weer mag rijden:**

- Vraag iemand om naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt.
- Rijd niet als u niet goed ziet of als u minder alert bent. Bijvoorbeeld als u zich slaperig, nerveus of angstig voelt.
- Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit medicijn in belangrijke mate.
- Rijd niet langer dan een uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
- Rijd niet 's nachts of bij slecht weer.