

Medicijnen bij een staaroperatie



UW MEDICIJN IN HET KORT:

- Wordt gebruikt na een staaroperatie om een ontsteking, infectie en vochtophoping in het oog te voorkomen.
- Gebruik de druppels zo lang en zo vaak als uw dokter u verteld heeft.
- Draagt u lenzen? Vraag uw apotheek om advies.
- U merkt niet dat het medicijn helpt. U gebruikt ze ter voorkoming van andere ziektes aan uw oog.
- Bijwerkingen, zoals irritatie van het oog, of een rood oog, gaan meestal binnen 2 weken weer over.
- Een flesje oogdruppels kan na openen maar 4 weken bewaard worden.



WERKING

Hoe helpt dit medicijn?

U bent bij de oogarts geweest voor een behandeling van staar. Dit medicijn zorgt ervoor dat u geen klachten zoals een ontsteking, infectie en/of vochtophoping in het oog krijgt na de operatie.



GEBRUIK

Hoelang moet u dit medicijn gebruiken?

Vaak krijgt u vanuit het ziekenhuis een druppelschema mee. Zij vertellen ook wanneer u met het medicijn moet beginnen (voor of na de operatie). U moet dit medicijn meestal gebruiken tot ongeveer 4 weken na de operatie. Stop niet met dit medicijn zonder overleg met uw dokter. Vraag uw apotheker om uitleg, als het druppelschema voor u niet duidelijk is.

Wanneer merkt u dat dit medicijn helpt?

U merkt niet dat dit medicijn werkt. U gebruikt deze druppels om te voorkomen dat er andere ziektes aan het oog optreden.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Als u lenzen draagt, overleg dan altijd eerst met de dokter of apotheek of u deze mag blijven dragen. Het advies over het gebruik van lenzen kan per medicijn verschillen:

- Gebruikt u oogdruppels? Haal uw lenzen dan voor het toedienen van de druppels uit uw oog. Soms moet u een tijd wachten voordat u uw lenzen weer kunt indoen. Sommige oogdruppels bevatten namelijk een conserveermiddel. Dit kan problemen geven met contactlenzen. Ook het soort lenzen kan invloed hebben op het advies. Kijk in de bijsluiter wat voor uw medicijn geldt of vraag advies aan uw apotheek.
- Gebruikt u een oogzalf of ooggel? Draag dan liever geen lenzen, maar draag uw bril. Overleg met de dokter of apotheek als dit problemen geeft.

Lees de bijsluiter of een gebruiksinstructie voor meer informatie. Over het algemeen geldt:

- Was uw handen met zeep en droog ze goed af.
- Trek het onderste ooglid voorzichtig omlaag, zodat er een gootje ontstaat.
- Buig uw hoofd achterover.
- Zorg ervoor dat het flesje of de tube het oog, de oogleden en de wimpers niet raakt.
- Gebruikt u druppels of een gel? Dan moet u 1 druppel in dit gootje druppelen. Niet in een ooghoek druppelen! Sluit na het druppelen het oog (niet knijpen).

- Gebruikt u de zelf? Dan moet u 1 streepje van 1 cm in het gootje aanbrengen. Daarna meestal een paar keer knippen met uw ogen.
- Bij gebruik oogdruppels of ooggel: druk uw traanbuis dicht door zachtjes net onder het kleine harde bobbeltje in de binnenhoek van uw oog (aan de neuskant) te drukken. Doe dit direct na het druppelen om bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen. Doe dit minstens 1 minuut. Heeft u toch last van bijwerkingen? Houd dan 3 tot 5 minuten aan.
- Moet u meerdere medicijnen gebruiken voor het oog? Wacht dan tenminste 5 minuten na het toedienen van het ene medicijn, voordat u de volgende toedient.

Lukt het niet goed om het medicijn toe te dienen? Vraag uw apotheek om advies. De apotheek heeft hulpmiddelen voor het druppelen.

Medicijn vergeten?

Gebruik geen dubbele dosering. Lees ook de bijsluiter of kijk op www.apotheek.nl voor meer informatie.

Hoe moet u dit medicijn bewaren?

Bewaar deze medicijnen bij kamertemperatuur. Niet in de koelkast of vriezer. Na openen van de verpakking is dit medicijn niet lang houdbaar. Meer informatie over de houdbaarheid na openen vindt u in de bijsluiter.



BIJWERKINGEN

Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)?

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Als u dit medicijn gebruikt dan kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen:

- Irritatie van het oog: jeuk, tranen, branderig gevoel
- Oogpijn, rood oog
- Abnormaal gevoel in het oog
- Hoofdpijn
- Loopneus
- Wazig zien direct na het indruppelen

De meeste van deze bijwerkingen gaan binnen 2 weken over. Bel uw dokter als deze bijwerkingen niet over gaan.



EXTRA INFORMATIE

Wat kunt u zelf doen?

- Uw oog is na de operatie nog kwetsbaar. Houdt u zich daarom precies aan de leefregels, die uw oogarts u heeft meegegeven.
- Autorijden is niet toegestaan zolang u een oogverband draagt. Ga pas weer rijden als u goed kunt zien.
- Als u niet weet hoe u moet druppelen, vraag dan in de apotheek om een oogdruppelinstructie.

Lees voor meer informatie ook de bijsluiter.